

ご注意

- 特に、高齢者、小児の方は、お薬を飲み込むときに気管に入り、呼吸困難などを起こすおそれがありますので、ご注意ください。
- 目には使用しないでください。
- 小児の手の届かない所で、高温をさせて涼しい場所に保管してください。
- 主治医より特に指示がある場合には、それに従ってください。

お願い

- お薬の飲み合わせによって副作用が生じるおそれがあります。血液を固まりにくくするお薬であるワルファリンカリウムを服用中の方は、このお薬を服用することはできません。
ワルファリンカリウムの他にも、一緒に服用してはいけないお薬や、併用を注意すべきお薬があります。
- 他に服用しているお薬がある場合は必ず医師または薬剤師に伝えてください。
- 別の病院にかかるて新たに他のお薬を服用する場合も、必ず医師または薬剤師にこの服用の手引きを示すなど、服用しているお薬を伝えてください。

服用の手引き

口腔・食道カンジダ症治療剤

フロリードゲル経口用2%

ミコナゾール(一般名) [20gチューブ]



使用される患者様へ

口腔カンジダ症とは



- 「カンジダ菌」(カビの一種)の異常繁殖が原因で発症します。
- 頬の内側や口蓋(上あご)、舌にさまざまな症状が出ます。
- お子さま、お年寄り、糖尿病の方や唾液が少なく口が乾く方などは注意が必要です。
- ほかの病気の原因になる可能性もありますので、早めの治療が大切です。



不明な点がありましたら、主治医または薬剤師にご相談ください。

医療機関名

フロリードゲル経口用2%の効果的な使い方

1

- まず、うがいをして口の中を清潔にしてください。
- キャップ先端のとがった部分でチューブに穴を開けてください。



4

- お薬を含んだら、舌でまんべんなく口の中にぬりひろげてください。
- この状態で、できるだけ長く口の中に含んだあと飲み込んでください。
- 入れ歯の方は、よく洗浄して入れ歯にも少しお薬を付けてください。



2

- 主治医から指示されたお薬の1回量を清潔な専用スプーンにとります。



2.5g計量の場合



5g計量の場合

3

- お薬を口に含みます。
お薬の量が多い場合は、少しずつ
分けて口に含むようにしてください。



5

- 使用後のスプーンはよく洗浄し、清潔に保管してください。
- 服用後、少なくとも1時間位は、うがい、歯みがき、飲食をしないようにしてください。

